

**Medikamentenliste + Dosierung**  
**Eichhörnchen**

**Antibiotika :**

**Convenia : (VP) 0,05ml/100g Tier ggf. nach 4-5 Tagen wdh.**

Wird gespritzt und daher **keine Probleme mit Durchfällen**. Bei erwachsenen und halbwüchsigen Tieren ideal, da **Langzeitwirkung** von ca. 4 Tagen bis ca. 1 Woche.

Bei Katzenbiss und schlimmeren Krähenverletzungen immer nach 4 Tagen wiederholen.

Gute Verträglichkeit auch bei **hartnäckigen** Abszessen, Lungenentzündung sowie Bissverletzungen und auch wenn Chloromycetin Palmitat nicht anschlägt.

**Chloromycetin Palmitat : (VP) 0,15ml/100g Tier 3x täglich mind. 5 Tage**

**Antibiotika der 1. Wahl bei Nagetieren.**

Behandlung von bakteriellem Durchfall, bei Bissverletzungen, Lungenentzündung sowie bei Abszessen.

**Cotrim K Saft : (VP) 0,1ml/100g Tier 2-3x tägl. mind. 5 Tage**

Behandlung von bakteriellem Durchfall, Lungenentzündung, Harnwegsinfektionen, Ohrenentzündungen sowie des Mund- und Rachenraums (mögliche Wirksamkeit gegen Kokzidien)

sehr gut verträglich

**Chloramphenicol Pumpspray : (VP) auf die Wunde sprühen**

nach Reinigung von Wunden wie Katzenbiss- oder Krähenverletzungen aufsprühen.

**Schmerzmittel :**

**Metacam : (VP) für Katzen 0,5mg/ml 1 Tropfen 1-2 x täglich**

**Schmerzmittel der 1. Wahl**

Bei Tieren die auf den Kopf gefallen sind, Bissverletzungen, Entzündungen, Schwellungen sowie Schmerzen im Allgemeinen.

**Novalgin Tropfen : (VP) 1 Tropfen alle 4-6 Std.**

starke Schmerzen und Fieber nur für zahme Tiere geeignet, da die Gabe alle 4-6 Std. erfolgen muss.

**Traumeel : (AP)**

**2-4x tägl. 0,1-0,2ml Wunden können damit auch abschließend gespült werden**

zur unterstützenden Behandlung bei Trauma, Kopfschiefhaltung Entzündungen, Schwellungen, Schock, Schmerzen im Allgemeinen.

**Alvegesic: (VP) (0,2mg/kg) 10mg/ml 1:10 verdünnt davon max. 0,05ml/100g alle 4 Std.**

bei starken Schmerzen. Kann auch ergänzend bei Inhalationsnarkose gegeben werden.

**Kortison :**

**Voren Depot : (VP) 0,05ml/100g wdh. ggf. nach 3-4 Tagen Kortison**

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Schock, Krämpfe

**Prednisolon 1%: (VP) 0,01-0,02ml/100g**

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Schock, Krämpfe (kann auch oral verabreicht werden)

**Dexamethason : (VP) 0,01-0,02ml/100g**

Bei Schockzuständen, Krämpfe (kann auch oral verabreicht werden)

**Magen – Darm Probleme :**

**MCP Tropfen :** (VP) wurde vom Markt genommen !

**Alternativ : Emeprid Saft :** (VP) *1 Tropfen / 100g oral eingeben bis zu 3x tägl.*  
bei Übelkeit / Erbrechen

**Nux Vomica Homaccord :** (A)

bei Verdauungsproblemen auch bei der Nahrungsumstellung gerne anfangs auch zu jeder Fütterung 1 Tropfen

**Bene Bac oder auch ProPre-Bac (verbesserte Rezeptur) Bac :** (F)

*zu jeder Fütterung ½ -1 Erbsengröße*

Bei Problemen im Darm.

Bei Umstellung von Muttermilch auf Katzenmilch.

**Stullmisan :** (F) *ca. 1 Msp. zu jeder Fütterung*

Homöopathisches Mittel zur Linderung bzw. stoppen von Durchfällen.

**Heilerde :** (F) bei Magen-Darm Problemen gerne auch in einer Schüssel mit etwas Wasser anbieten.

**Sab Tropfen oder Dimeticon (speziell für Tiere) :** (F)

*nach Bedarf ggf. zu jeder Fütterung 1-3 Tropfen*

Bei Blähungen sowie Durchfällen.

**Coenzyme Compositum :** (A) *nach Bedarf*

Behandlung chronischer Erkrankungen mit Störung der körpereigenen Enzymsysteme.

**Parasiten Mittel :**

**Appertex :** (AP) wurde vom Markt genommen !

**Das Ersatzmittel ist Vecoxan :** ( VP )

**0,04-0,05 ml/100g**

*2x im Abstand von 2-3 Tagen evtl. wdh. nach 1 Woche*

*bei Leberkokzidiose 1x tägl. über 12-14 Tage*

jedes Eichhörnchen wird bei Befall oder vor der Unterbringung in eine Auswilderungsvoliere gegen Kokzidien behandelt.

( Stresssituationen = Vermehrung von Kokzidien )

**Baycox :** (VP) 5% 0,02ml/100g *1xtägl. 3-5 Tage ggf. Wdh.*

Gegen Kokzidiosen. **Achtung Baycox 2,5% darf ausschließlich über das Trinkwasser verabreicht werden !**

Niemals unverdünnt oral eingeben da es ätzend wirkt !!!! Baycox 5% ist eine orale Suspension.

Allerdings ist das Vecoxan bei Kokzidiose zu bevorzugen.

**Kokzidiol SD :** (VP) 1g/1kg ! *5-7 Tage ggf. Wdh.*

Gegen Kokzidiosen sowie bei Infektionen des Magen-Darm Traktes besonders bei Coli-Infektionen und Salmonellosen. Verabreichung über das Trinkwasser. Optimal zur Behandlung bei größeren und mehreren Tieren in Volieren.

**Panacur 2,5% oder 10% :** (VP)

*2,5% 0,1ml/100g 10% 0,02ml/100g 3-5 Tage ggf. Wdh.*

Behandlung bei Giardien und bei Wurmbefall. Dosierung bei den verschiedenen Stärken beachten.

**Stronghold : ( für Katzenwelpen ) : (VP) max. ½ Tropfen pro Tier in den Nacken 1malig  
( keinesfalls vor der 6. Woche anwenden ! )**

Das Eichhörnchen wird bei Befall mit Stronghold entwurmt und gegen Flöhe und Milben behandelt ( Epidemie ). **Sofern das Absammeln der Flöhe möglich ist, Verzicht auf Flohmittel !**  
Niemals Flohpuder wie Bolfo oder Frontline Spray verwenden.

**Petvital Verminex von Canina: (F)**

Verklebt Flöhe laut Hersteller gegen Lästlinge aller Art.  
Frei von toxischen Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen bedenklichen Stoffen.  
Bei erwachsenen Eichhörnchen max. 10 Tropfen beginnend im Nacken an der Wirbelsäule verteilt auftropfen.  
Ebenfalls 1 Tropfen in den Innenschenkeln und Innenarmen .

**Exner Petguard : (F)**

Wirkung gegen Pilze, Flöhe, Haarlinge, Läuse, Milben sowie Zecken.  
Hierbei handelt es sich um ein absolut ungefährliches Mittel das vorsichtig auf das Tier aufgesprüht wird. Bei Parasiten kommt es nach kurzer Zeit zu Verklebung des Bewegungsapparates sowie der Verstopfung der Atemwege. Bei Pilz wird der Wachstum gehemmt.  
Weitere Infos auch im Gutachten : [www.exner-petguard.de](http://www.exner-petguard.de)

**Nahrungsergänzung / Elektrolyte / Infusionen :**

**Sterfofundung BG-5: (VP) 5ml/100g in 24 Std. 1-1,5ml/100g 3x tägl.**

Elektrolyte mit Glucose als Infusion sowie zur oralen Gabe.  
Bei geschächten Tieren.

**Ringerlösung : (A) 5ml/100g in 24 Std. 1-1,5ml/100g 3x tägl.**

Elektrolyte als Infusion sowie zur oralen Gabe.

**Oralpäden (Apfel-Banane): nach Bedarf 1 Prise mehrmals täglich**

Elektrolyt Pulver. Mit Flüssigkeit (auch mit Aufzuchtsmilch) anrühren.

**Aktivtropfen von Herbavital : (F) 1-2 Tropfen oral**

bei Tieren mit Kreislaufproblemen gerne auch als 1. Maßnahme einen Tropfen bei geschwächten Neuankommelingen ebenso gut bewährt vor, während und nach einer OP.

**Vitamin B Komplex : (VP) 0,05-0,1ml / 100g subkutan / p.o. (subkutan verdünnen)**

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Krämpfe, appetitanregend sowie als Zusatz bei Infusionen.

**Amynin : (AP) wurde vom Markt genommen !**

**Ersatzmittel : Jecuplex : (VP) nach Bedarf subkutan max. 0,2-0,5ml /100g 1-2x tägl.**

Vitaminreiche Lösung zur Anreicherung von Infusionsflüssigkeit.

**Complexamin : (F) über das Trinkwasser geben**

Ergänzungsfuttermittel bei Tieren mit Mangelerscheinungen

Zur Stärkung der Widerstandskraft in Stresssituationen kann auch über das Trinkwasser verabreicht werden.

Alternativ Nager Vitamin Tropfen.

**Stärkung des Immunsystems :**

**Zylexis : (VP)**      *1 Ampulle subkutan ggf. auf 2 Tage aufteilen*  
zur Stärkung des Immunsystems.  
Bei Abszessen, Erkältungen, bakteriellen sowie Virusinfektionen

**Engystol : (AP)**      *3-4x tägl. 0,1-0,2ml p.o.*  
zur Stärkung des Immunsystems vor allem bei Atemwegsproblemen.

**Albrecht Immun : (AP)**      *3-4x tägl. 0,1-0,2ml p.o.*  
Molke aus Kolostrum. Enthält einen hohen Anteil an natürlichen Immunglobulinen.  
Sehr gut bei Immungeschwächten oder sehr kleinen Babys. Auch bei Tieren mit starkem Durchfall.

**Erkältung /Lungenentzündung:**

**Bisolvon Pulver : (AP)**      *Injektionslösung : 0,05ml/100g 2-3x tägl. orale Eingabe : 1 Msp. 2-3x tägl.*  
Schleimlöser bei Erkältungen.

**NAC (Ratiopharm) : (VP)**      *orale Eingabe : 1 Msp. 2-3x tägl.*  
Schleimlöser bei Erkältungen

**Bricanyl : (VP)**      *subkutan oder oral : 1:10 verdünnt davon 0,1ml/100g alle 2-3 Std.*  
Akutbehandlung bei Atemnotzuständen

**Wundversorgung :**

**Medihoney : (AP)**      *nach Bedarf auftragen*  
Antibakterieller medizinischer Honig. Ideal für Abszesswunden sowie Bissverletzungen.

**Rebohexanid Pflegegel :** Wundreinigung, Wundpflege, Wundheilung auch bei großflächigen offenen Wunden.  
Legt sich wie eine Hautschicht über die Wunde. Gel ist in einer festen Konsistenz.

**Bepanthen Creme :**  
besonders gut geeignet für entzündete Haut z.B. im Afterbereich bei starken Durchfällen.

**Leukase N Kegel : (VP)**      *je nach Größe der Wunde ½ – 1 Tablette*  
Nach Abszess Behandlungen oder auch bei Katzenbissverletzungen.

**Betaisodonna : (AP)**  
zur Wundversorgung. Desinfizierend da Jod haltig.

**Dentisept : (F)**      *nach Bedarf auftragen*  
Zahnfleischentzündungen, ( Zahnfehlstellungs -Hörnchen )

**Augen :**

**Floxal Tropfen oder Salbe : (VP) *1 Tropfen bzw. etwas Salbe ins Auge nach Bedarf***  
eitrige Augen, Bindehautentzündungen, Bakteriell bedingte Probleme

**VitA-POS Salbe : (AP) *etwas Salbe ins Auge nach Bedarf***  
Pfllegesalbe bei Hornhautdefekt, Entzündungen, zur Regeneration der Horn- Bindehaut, befeuchtet das Auge

**Euphrasia Augentropfen: (AP) *1 Tropfen ins Augen nach Bedarf***  
zur Pflege bei Reizungen am Auge, als Ergänzung bei einer Medikamentösen Behandlung

**Corneregel : (AP) *etwas Gel ins Auge nach Bedarf***  
zur Pflege bei Reizungen am Auge, Bei Hornhautverletzungen, als Ergänzung bei einer Medikamentösen Behandlung

**Sedation / Narkose :**

**Diazepam Tropfen : (VP) *für halbwüchsige Tiere 1 Tropfen für Erw. 2 Tropfen***  
orale Eingabe für einen stressfreien Tierarztbesuch. Sollte nur bei erwachsenen oder sehr scheuen halbwüchsigen Tieren verwendet werden.

**Isofluran : (VP) *nach Bedarf***  
für die Inhalationsnarkose, eine schonende Methode mit super Verträglichkeit für das Tier ist.  
Ggf. dazu ein Schmerzmittel verabreichen.

AP = apothekenpflichtig ( frei erhältlich in jeder Apotheke )

VP = verschreibungspflichtig

F = frei erhältlich

**Diese Liste basiert auf meist jahrelanger Erfahrung von Tierärzten in der Behandlung von Eichhörnchen.**

Alle Angaben bezüglich Dosierung und Anwendung beruhen auf unseren persönlichen, meist jahrelangen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Tierärzten.

Daher wird in keinem Fall eine Haftung übernommen.

Eine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben kann nicht gegeben werden.

Im Zweifelsfall sollte bezüglich der Wirksamkeit, Dosierungsempfehlung, Kontraindikationen sowie Nebenwirkungen eine eigene Prüfung erfolgen.

Es ist möglich dass es gleichwertige Präparate von anderen Herstellern gibt.