

Medikamentenliste + Dosierung

Eichhörnchen

ANTIBIOSE :

Convenia : (VP) *0,05ml/100g Tier ggf. nach 4-5 Tagen wdh.*

Wird gespritzt und daher **keine Probleme mit Durchfällen**. Bei erwachsenen und halbwüchsigen Tieren ideal, da **Langzeitwirkung** von ca. 4 Tagen bis ca. 1 Woche.

Bei Katzenbiss und schlimmeren Krähnenverletzungen immer nach 4 Tagen wiederholen.

Gute Verträglichkeit auch bei **hartnäckigen** Abszessen, Lungenentzündung sowie Bissverletzungen und auch wenn Chloromycetin Palmitat nicht anschlägt.

Cotrim K Saft : (VP) *0,1ml/100g Tier 2-3x tägl. mind. 5 Tage*

Cotrim E Saft *0,05ml/100g Tier*

Behandlung von bakteriellem Durchfall, Lungenentzündung, Harnwegsinfektionen, Ohrenentzündungen sowie des Mund- und Rachenraums (mögliche Wirksamkeit gegen Kokzidien) sehr gut verträglich

Chloramphenicol N-Pulver : (VP)

3x täglich mind. 5 Tage

Antibiotika der 1. Wahl bei Nagetieren.

Behandlung von bakteriellem Durchfall, bei Bissverletzungen, Lungenentzündung sowie bei Abszessen.

Veraflox Suspension 25mg/ml: (VP) *0,03ml / 100g 1x täglich über mindestens 5 Tage*

Gute Wirksamkeit bei Abszessen, Katzenbissverletzungen

Parofoor: (VP) *2g /1,4ml Flüssigkeit davon 0,2ml/100g Tier 2-4 Tage 2x täglich dann 8-10 Tage 1x täglich p.o. in Ausnahmen bei großen Beständen in Volieren kann man 40g /1 Liter Wasser über das Trinkwasser geben.(Ersatzweise Humatin Kapseln, da aber andere Dosierung)*

Mittel zur Behandlung von Kryptosporidien und E.coli Bakterien

SCHMERZMITTEL :

Metacam : (VP) *für Katzen 0,5mg/ml 1 Tropfen 1-2 x täglich*

Schmerzmittel der 1. Wahl

Bei Bissverletzungen, Entzündungen, Schwellungen, Frakturen sowie Schmerzen im Allgemeinen.

Novalgin Tropfen : (VP) *1 Tropfen alle 4-6 Std.*

starke Schmerzen, Krämpfe, Bauchschmerzen, Fieber Gabe muss alle 4-6 Std. erfolgen.

Traumeel : (AP) *2-4x tägl. 0,1-0,2ml Wunden können damit auch abschließend gespült werden*

zur unterstützenden Behandlung bei Trauma, Kopfschiefhaltung Entzündungen, Schwellungen, Schock, Schmerzen im Allgemeinen.

Alvegesic, Butorgesic, Butorphanol : (VP) *(0,2mg/kg) 10mg/ml 1:10 verdünnt davon max. 0,05ml/100g alle 4 Std.*

bei starken Schmerzen. Kann auch ergänzend bei Inhalationsnarkose gegeben werden.

SCHWINDEL / ÜBELKEIT :

MCP Saft : (VP) *0,05-0,1ml /100g bis zu 3x täglich*

+ **Emeprid Saft** : (VP) *1-2 Tropfen / 100g oral eingeben bis zu 3x tägl.*

bei Übelkeit / Erbrechen

Cerenia : (VP) *0,01ml/100g s.c.*

wird subkutan gespritzt. Gute Wirksamkeit bei Schwindel / Übelkeit Apetitanregend

Vertigoheel : (AP) *1 Tropfen oral 2x tägl.*

Gegen Schwindel vor allem bei SHT Trauma

PARASITENMITTEL :

Vecoxan : (VP) 0,04-0,05 ml/100g 2x im Abstand von 2-3 Tagen evtl. wdh. nach 1 Woche bei Leberkokzidiose 1x tägl. über 12-14 Tage

jedes Eichhörnchen wird bei Befall oder vor der Unterbringung in eine Auswilderungsvoliere gegen Kokzidien behandelt. (Stresssituationen = Vermehrung von Kokzidien)

Baycox : (VP) 5% 0,02ml/100g 1xtägl. 3-5 Tage ggf. Wdh.

Gegen Kokzidiosen. **Achtung Baycox 2,5% darf ausschließlich über das Trinkwasser verabreicht werden !** Niemals unverdünnt oral eingeben da es ätzend wirkt !!!! Baycox 5% ist eine orale Suspension. Allerdings ist das Vecoxan bei Kokzidiose zu bevorzugen.

Kokzidiol SD : (VP) Berechnung nach Trinkmenge ! 5-7 Tage ggf. Wdh.

Gegen Kokzidiosen sowie bei Infektionen des Magen-Darm Traktes besonders bei Coli-Infektionen und Salmonellosen. Verabreichung über das Trinkwasser. Optimal zur Behandlung bei größeren und mehreren Tieren in Volieren.

Stronghold : (für Katzenwelpen) : (VP) max. ½ Tropfen pro Tier in den Nacken 1malig (keinesfalls vor der 6. Woche anwenden !)

Das Eichhörnchen wird bei Befall mit Stronghold entwurmt und gegen Flöhe und Milben behandelt (Epidemie). **Sofern das Absammeln der Flöhe möglich ist, Verzicht auf Flohmittel !**

Niemals Flohpuder wie Bolfo oder Frontline Spray verwenden.

Panacur 2,5% oder 10% : (VP)

2,5% 0,1ml/100g 10% 0,02ml/100g 3-5 Tage ggf. Wdh.

Behandlung bei Giardien und bei Wurmbefall. Dosierung bei den verschiedenen Stärken beachten.

Capstar Tablette 11,4mg : (AP) orale Eingabe in Wasser aufgelöst 0,1mg /100g

Schnelle Wirkung bei Madenbefall (wo sie nicht abgesammelt werden können und wenn sie bereits im Tier sind)

Petvital Verminex von Canina: (F)

Verklebt Flöhe laut Hersteller gegen Lästlinge aller Art.

Frei von toxischen Insektiziden, Lösungsmitteln und anderen bedenklichen Stoffen.

Bei erwachsenen Eichhörnchen max. 10 Tropfen beginnend im Nacken an der Wirbelsäule verteilt auftropfen. Ebenfalls 1 Tropfen in den Innenschenkeln und Innenarmen .

Exner Petguard : (F)

Wirkung gegen Pilze, Flöhe, Haarlinge, Läuse, Milben sowie Zecken.

Hierbei handelt es sich um ein absolut ungefährliches Mittel das vorsichtig auf das Tier aufgesprüht wird. Bei Parasiten kommt es nach kurzer Zeit zu Verklebung des Bewegungsapparates sowie der Verstopfung der Atemwege. Bei Pilz wird der Wachstum gehemmt.

Weitere Infos auch im Gutachten : www.exner-petguard.de

WUNDVERSORGUNG :

Medihoney : (AP) nach Bedarf auftragen

Antibakterieller medizinischer Honig. Ideal für Abszesswunden sowie Bissverletzungen.

Leukase N Kegel : (VP) je nach Größe der Wunde ½ – 1 Tablette

Nach Abszess Behandlungen oder auch bei Katzenbissverletzungen.

Tyrosur Gel und Puder : (AP) nach Bedarf auftragen

Infektiöse Wunden auch Katzenbiss zusätzlich zur Antibiose lokal auftragen.

(bei stark nässenden Wunden hat sich der Puder bewährt)

Manukalind : (F) nach Bedarf auftragen

Auf schlecht heilende Wunden auftragen.

Rebohexanid Wundgel : (AP) nach Bedarf auftragen

Zum reinigen sowie feucht halten von Wunden hilft auch bei MRSA Keimen.

Adrenalin : (VP) einige Tropfen (getränkter Tupfer / Wattestäbchen) mit Druck auf die Wunde

Stark blutende Wunden

Dermamycin Salbe : (VP) nach Bedarf auftragen

bei bakterieller Dermatitis, nässenden, juckenden Hautstellen

KORTISON :**Voren Depot : (VP) 0,05ml/100g wdh. ggf. nach 3-4 Tagen**

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Schock, Krämpfe

Prednisolon 1% : (VP) 0,01-0,02ml/100g

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Schock, Krämpfe (kann auch oral verabreicht werden)

Dexamethason : (VP) 0,01-0,02ml/100g

Bei Schockzuständen, Krämpfe (kann auch oral verabreicht werden)

ZÄHNE :**Dentisept : (F) nach Bedarf auftragen**

Zahnfleischentzündungen, (Zahnfehlstellungen -Hörnchen)

Haemostatic Solution : (AP) nach Bedarf auftragen

Zahnfleischbluten, Verletzungen nach der Zahnkorrektur

ATEMWEGE :**Bisolvon Pulver : (AP) 0,05ml/100g alle 8-12 Std. orale Einnahme**

schleimlöser bei Erkältungen.

Bricanyl : (VP) 0,02ml/kg → 1:10 verdünnen davon 0,02ml/100g

Inhalation (Kochsalzlösung ggf. 1 Tropfen Dexamethason + 0,5ml ACC Injekt oder :
0,5ml ACC Injekt + 0,25ml Pulmicort

Olynth : (A) (Säuglingsnasentropfen) 1-2 Tropfen in die Nasenlöcher um Verklebungen ... zu lösen

OHRENENTZÜNDUNG :

Antibiose z.B. Cotrim K und zusätzlich :

Ohrentropfen - Mischung : 4 Teile NaCl 2 Teile Baytril 2,5% und 2 Teile Hexadreson nach Bedarf

AUGEN :**Bepanthen Augensalbe, Corneregel, VITA POS : (AP) nach Bedarf mindestens 2x täglich anwenden**

Zur Pflege und Befeuchtung von gereizten Augen, zur Regeneration von Bindehaut- und Hornhautverletzungen, als Ergänzung bei einer medikamentösen Behandlung

Euphrasia Augentropfen : (AP) nach Bedarf 1 Tropfen ins Auge

zur Pflege bei gereizten Augen, als Ergänzung bei einer medikamentösen Behandlung

Floxa : (VP) nach Bedarf mind. 2x tägl. auftragen

antibiotische Augentropfen oder Salbe bei eitrigen Augenentzündungen sowie bei Fremdkörpern im Auge

Cortisonhaltige Augensalben : (VP) nach Bedarf auftragen

Vorsicht bei Hornhautverletzung nicht anwenden

VERDAUUNG :**Bene Bac oder auch ProPre-Bac (verbesserte Rezeptur) Bac : (F)**

zu jeder Fütterung ½ -1 Erbsengröße

Bei Problemen im Darm.

Bei Umstellung von Muttermilch auf Katzenmilch.

Stullmisan : (F) ca. 1 Msp. zu jeder Fütterung
Mittel zur Linderung bzw. stoppen von Durchfällen.

Sab Tropfen oder Dimeticon (speziell für Tiere) : (F)
nach Bedarf ggf. zu jeder Fütterung 1-3 Tropfen
Bei Blähungen sowie Durchfällen.

Lacteol Pluver : (AP) je nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen
Bei Durchfallerkrankungen. Gute Darmbakterien.

Perenterol : (AP) je nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen
Bei Durchfallerkrankungen. Gute Darmbakterien.

Infecto Diarrstop LGG Banane : (AP) je nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen
Bei Durchfallerkrankungen. Gute Darmbakterien.

Dystan : (F) ca. 1 Msp. zu jeder Fütterung
Mittel zur Linderung bzw. stoppen von Durchfällen.

Diarsanyl : (F) 3x tägl. ca. ½ Erbsengröße in Wasser auflösen
Bei starken Durchfällen es kleidet den Darm aus.

Nux Vomica D12 : (A) 3 Globuli auf 1ml 0,1ml 2-3xtäglich

BLASE :

S U C : Solidago, Ubichinon, Coenzyme (am besten Ampullen mischen) nach Bedarf 3x täglich 0,1ml aus der Mischung

Hilft gut bei Harngrieß dazu Antibiose (Cotrim)

Es kann sein dass der Urin vom Tierarzt mit einer ganz dünnen Nadel abgezogen werden muss.

HARNWEGS /PENISVORFALL :

Zum Abschwellen Cortisonhaltige Augensalbe nach Bedarf mehrmals täglich auftragen
Schmerzmittel und ggf. Antibiose

NAHRUNGSERGÄNZUNG / ELEKTROLYTE :

Vitamin B Komplex : (VP) 0,05-0,1ml / 100g subkutan

Bei Kopfschiefhaltung, Lähmungen, Krämpfe, appetitanregend sowie als Zusatz bei Infusionen.

Amynin : (AP) 0,5 bis 3ml pro Tag pro Tier

Vitaminreiche Lösung zur Anreicherung von Infusionsflüssigkeit.

Jecuplex : (VP) nach Bedarf subkutan max. 0,2-0,5ml /100g 1-2x tägl.

Vitaminreiche Lösung zur Anreicherung von Infusionsflüssigkeit.

Oralpädon Apfel-Banane : (AP) nach Bedarf bis zu 3x tägl. 1 Msp. in Flüssigkeit auflösen

Elektrolyte bei Durchfallerkrankungen.

Sterofundin BG-5 : (VP) 5ml/100g in 24 Std. nach Bedarf 2-3x täglich

Elektrolyte mit Glucose als Infusion sowie zur oralen Gabe

Ringerlösung : (A) 5ml/100g in 24 Std. nach Bedarf 2-3x täglich

Elektrolyte zur Infusion sowie zur oralen Gabe

Aktivtropfen von Herbavital : (F) 1-2 Tropfen oral

bei Tieren mit Kreislaufproblemen. Auch als 1. Maßnahme 1-2 Tropfen auf die Mundschleimhaut

Multivitamin Tropfen für Nager : (F) gabe nach Bedarf über das Trinkwasser oder verdünnt oral

IMMUNSYSTEM :

Zylexis : (VP) 1 Ampulle subkutan ggf. auf 2 Tage aufteilen

zur Stärkung des Immunsystems.

Bei Abszessen, Erkältungen, bakteriellen sowie Virusinfektionen

Bioserin : (F) 0,1-0,2ml /100g Tier 2-3x tägl.

zur Stärkung des Immunsystems

Engystol : (AP) 3-4x tägl. 0,1-0,2ml p.o.

zur Stärkung des Immunsystems vor allem bei Atemwegsproblemen.

Albrecht Immun : (AP) 3-4x tägl. 0,1-0,2ml p.o.

Molke aus Kolostrum. Enthält einen hohen Anteil an natürlichen Immunglobulinen.

Sehr gut bei Immungeschwächten oder sehr kleinen Babys. Auch bei Tieren mit starkem Durchfall.

Propolis Tropfen : (F)

zur Stärkung des Immunsystems kann in einen extra Schälchen mit Wasser älteren Tieren angeboten werden.

Manuka Honig : (F)

zur Stärkung des Immunsystems nach Bedarf in warmem Wasser auflösen

SEDATION / NARKOSE :

Diazepam Tropfen : (VP) für halbwüchsige Tiere 1 Tropfen für Erw. 2 Tropfen

orale Eingabe für einen stressfreien Tierarztbesuch. Sollte nur bei erwachsenen oder sehr scheuen halbwüchsigen Tieren verwendet werden.

Isofluran : (VP) nach Bedarf

für die Inhalationsnarkose, eine schonende Methode mit super Verträglichkeit für das Tier ist.

Ggf. dazu ein Schmerzmittel verabreichen.

AP = apothekenpflichtig (frei erhältlich in jeder Apotheke)

VP = verschreibungspflichtig

F = frei erhältlich

Diese Liste basiert auf meist jahrelanger Erfahrung von Tierärzten in der Behandlung von Eichhörnchen.

Alle Angaben bezüglich Dosierung und Anwendung beruhen auf unseren persönlichen, meist jahrelangen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Tierärzten.

Daher wird in keinem Fall eine Haftung übernommen.

Eine Garantie auf Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben kann nicht gegeben werden.

Im Zweifelsfall sollte bezüglich der Wirksamkeit, Dosierungsempfehlung, Kontraindikationen sowie Nebenwirkungen eine eigene Prüfung erfolgen.

Es ist möglich dass es gleichwertige Präparate von anderen Herstellern gibt.